

*Version Web*

## Administration de l'acétaminophène per os ou en suppositoire pour la clientèle externe

ÉMETTEUR :	Président(e) du CMDP		
APPROUVÉ PAR :	Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens		
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR :	2006-01-19	DATE DE RÉVISION PRÉVUE :	2019
DATE DE RÉVISION :	2015-09-11		
CODE DE CLASSIFICATION :	ADM-316-06		
ORIGINAL SIGNÉ PAR :	Présidente du CMDP, Marie-Josée Hotte		

CETTE ORDONNANCE COLLECTIVE REMPLACE LE PROTOCOLE A-1.18-1 ET A-1.18-6.1 DU CLSC

### ORDONNANCES COLLECTIVES

Une ordonnance collective est une ordonnance établie par règlement du CMDP à l'effet de poser certains actes ou de procéder systématiquement à certains examens ou traitements sans attendre d'ordonnance médicale individuelle chez les bénéficiaires de catégories déterminées dans cette ordonnance et le cas échéant, selon le protocole ou la méthode de soins desquels elle relève.

### PERSONNES HABILITÉES À EXÉCUTER L'ORDONNANCE

Infirmières habilitées et le service de santé de l'Université de Sherbrooke.

### GROUPES DE PERSONNES OU SITUATION CLINIQUE VISÉE PAR L'ORDONNANCE

Toute clientèle externe.

### INDICATIONS

1. Hyperthermie : T° buccale >38° C ou rectale : >38,5° C.
2. Prévention des convulsions fébriles chez un client présentant un antécédent de convulsions.
3. Prévention d'une réaction potentielle à un vaccin chez un client.
4. Soulagement d'une douleur légère non progressive et d'étiologie bénigne (ex : dysménorrhée, céphalée, douleur dentaire, myalgie, etc.)

N. B. L'autorisation parentale est requise si le client est âgé de moins de 14 ans.

## CONTRE-INDICATIONS

1. Allergies au produit (Tylenol, Atasol, Acétaminophène) ou à ses dérivés (Empracet, Percocet, etc).
2. Insuffisance hépatique grave.
3. Chimiothérapie avec neutropénie car ces personnes sont plus fragiles aux infections. La prise d'antipyrétiques (Acétaminophène, AAS, Ibuprofène) pourrait masquer une infection grave.
4. Bébé de moins de 3 mois sauf si fièvre post-vaccination ( $T^{\circ}$  axillaire  $> 37^{\circ}$  C,  $T^{\circ}$  rectale  $> 38^{\circ}$  C).
5. Fièvre depuis plus de 4 heures chez une femme enceinte.
6. Fièvre depuis plus de 24 heures chez une femme en post-partum.

## PROCÉDURE

Voir le tableau des posologies :

### Calcul de la posologie en fonction du poids

Groupe d'âge	Poids Kilos	Poids Livres	Dose unique maximale (mg)	Dose unique Gouttes	Liquide		Comprimés à croquer	
				Acétaminophène Atasol Tempra Tylénol 80 mg / 1 ml	Atasol Tempra (sirop) 80 mg / 5 ml	Acétaminophène Tylénol (élixir) 160 mg / 5 ml	Acétaminophène Tempra Tylénol 80 mg / co	Tempra Tylénol (junior) 160 mg / co
0 – 3 mois	2,5 – 3,9	6 – 8	40 mg	0,5 ml	2,5 ml	*1,25 ml	---	---
	4,0 – 5,4	9 – 11	60 mg	0,75 ml	3,75 ml	*1,25 ml		
4 – 11 mois	5,5 – 6,4	12 – 14	80 mg	1,0 ml	5 ml	2,5 ml	1 co	---
	6,5 – 7,9	15 – 17	100 mg	1,25 ml	5 ml	2,5 ml	1 co	
12 – 23 mois	8,0 – 9,0	18 – 20	120 mg	1,5 ml	7,5 ml	*3,75 ml	1 ½ co	---
	9,1 – 10,9	21 – 23	140 mg	1,75 ml	7,5 ml	*3,75 ml	1 ½ co	
2 – 3 ans	11,0 – 11,9	24 – 26	160 mg	2,0 ml	10 ml	5,0 ml	2co	1 co
	12,0 – 13,4	27 – 29	180 mg	2,25 ml	10 ml	5,0 ml	2co	1 co
4 – 5 ans	13,5 – 14,5	30 – 31	200 mg	2,5 ml	10 ml	5,0 ml	2 ½ co	
	14,6 – 15,4	32 – 33	220 mg	2,75 ml	10 ml	5,0 ml	2 ½ co	
4 – 5 ans	15,5 – 15,9	34 – 35	240 mg	3,0 ml	15 ml	7,5 ml	3 co	
	16,0 – 21,9	36 – 47	240 mg	3,0 ml	15 ml	7,5 ml	3 co	1 ½ co
6 – 8 ans	22,0 – 26,9	48 – 59	320 mg	4,0 ml	20 ml	10,0 ml	4 co	2 co
9 – 10 ans	27,0 – 31,9	60 – 71	400 mg	5,0 ml	25 ml	12,5 ml	5 co	2 ½ co
11 ans	32,0 – 43,9	72 – 95	480 mg	6,0 ml	30 ml	15,0 ml	6 co	3 co

\* À la limite, une dose seulement pour dépanner à moins d'avoir une mesure précise autre que le gobelet qui n'est pas gradué.

Groupe d'âge	Poids Kilos	Poids Livres	Dose unique maximale (mg)	Dose unique Gouttes	Liquide		Comprimés à croquer	
				Acétaminophène Atasol Tempra Tylénol 80 mg / 1 ml	Atasol Tempra (sirop) 80 mg / 5 ml	Acétaminophène Tylénol (élixir) 160 mg / 5 ml	Acétaminophène Tempra Tylénol 80 mg / co	Tempra Tylénol (junior) 160 mg / co
12 ans	32,0 – 43,9	72 – 95	480 mg	6,0 ml	30 ml	15,0 ml	6 co	3 co
Adultes (13 ans et plus)	Comprimés de 325 mg / co : 1 à 2 co q. 4 h, max : 4000 mg / jr – 6 doses de 2 co / 24 h.							
	Comprimés de 500 mg / co : 1 à 2 co q. 4 h à 6h, max : 4000 mg / jr – 4 doses de 2 co / 24 h.							

## POSOLOGIE VOIE RECTALE D'ACÉTAMINOPHÈNE

Chaque suppositoire contient : 120, 325 ou 650 mg	1 suppositoire 120 = 120 mg ½ suppositoire 325 = 162.5 mg 1 suppositoire 325 = 325 mg 1 ½ suppositoire 325 = 487.5 mg 1 suppositoire 650 = 650 mg
---	---

Se référer à la méthode de soins produite par l'Association des CLSC et des CHSLD du Québec, chapitre 5 (5.4 et 5.7.1)

N.B. Référer à un médecin, si réaction inhabituelle ou de type allergique.

Rédigé par: Dre Suzanne Gosselin, présidente CMDP CSSS-IUGS  
Marie Trousdell, DSI, CSSS-IUGS

ANNEXES :	
MOTS CLÉS :	ACETAMINOPHENE, ALLERGIES, CEPHALEES, DOULEURS, DOULEURS DENTAIRES, DYSMENORRHEE, FIEVRE, HYPERTHERMIE, METHODES DE SOINS DE SOINS, MYALGIE, ORDONNANCES COLLECTIVES, POSOLOGIES, VACCINS
DIFFUSÉ À :	DIRECTEURS, RESPONSABLE DES SOINS INFIRMIERS; COMPOSANTE CLSC, RESPONSABLE DU SERVICE MEDICAL; COMPOSANTE CLSC, MEMBRES DU CONSEIL DES MEDECINS, RESPONSABLE DES SOINS INFIRMIERS, DRE RENEE CARON, DIRECTRICE DU SERVICE DE SANTE DE L'UNIVERSITE DE SHERBROOKE

Chemin d'accès : U:\Documents\DSPPM\Documents administratifs\Ordonnances collectives CSSS-IUGS\ORD-CMDP-03 Web.doc